

DB4453

云 浮 市 地 方 标 准

DB4453/Txxxx—202X

中药材种子（种苗） 岗梅

Chinese medicinal materials' seeds (seedlings)—

Ilex asprella

(送审稿)

202X-XX-XX 发布

202X-XX-XX 实施

云浮市市场监督管理局 发 布

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 质量要求	2
5 检验方法	2
6 检验规则	3
7 包装、标志、运输和贮存	4

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由华润三九医药股份有限公司提出。

本文件由云浮市中医药局归口。

本文件起草单位：华润三九医药股份有限公司、深圳市中药制造业创新中心有限公司、广东银田农业科技有限公司、广州中医药大学、云浮市食品药品检验所。

本文件主要起草人：黄煜权、马庆、陈欣、王亮、黄锦鹏、张洪胜、曾烨、谢文波、叶姿、刘晖晖、刘子琪、陈岩、江嘉铅、李万忠、刘军民、陈立凯、詹若挺、黄海珍。

中药材种子（种苗） 岗梅

1 范围

本文件规定了中药材岗梅（梅叶冬青）种子和种苗的质量要求、检验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于广东省云浮市的中药材岗梅（梅叶冬青）种子、种苗生产者、经营管理者和使用者在种子生产、采收、调运、播种、贮藏以及贸易时的种子质量分级和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.2 农作物种子检验规程 扦样
GB/T 3543.6 农作物种子检验规程 水分测定
GB/T 3543.3 农作物种子检验规程 净度分析
GB/T 3543.7 农作物种子检验规程 其他项目检验
GB/T 3543.4 农作物种子检验规程 发芽试验
GB 2772 林木种子检验规程
GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

岗梅种子 seeds of *Ilex asprella*

梅叶冬青植株生长经开花结实所形成的植物学种子。

3.2

岗梅种苗 seedlings of *Ilex asprella*

梅叶冬青种子经过萌发培育后形成的植株幼苗。

3.3

种子批 seed lot

同一年度、同一来源、同一时期收获，质量基本一致，在规定数量之内的岗梅种子群体。

3.4

净度 purity

种子批或供检样品中净种子的重量占试验样品各成分重量总和的百分比。

3.5

地径 caliper

苗木地际直径，即苗木基部土痕处的粗度。

3.6

苗高 seedling height

自地径至顶芽基部的苗干长度。

4 质量要求

4.1 种子质量要求

岗梅种子质量应符合表 1 的规定。

表 1 岗梅种子质量要求

指标	质量指标		
	一级	二级	三级
组织形态与色泽	倒卵状椭圆形或长卵圆形，种壳坚硬，背面具 3 条脊和沟；种皮浅黄色或红褐色；		
种子规格	长 4.02 mm~6.79 mm，宽 1.14 mm~2.94 mm，厚 3.05 mm~5.12 mm。		
含水量/%		≤10	
净度/%	≥95	≥90	≥90
千粒重/g	≥5.8	≥5.2	≥4.8
发芽率/%	≥30	≥22	≥15

4.2 种苗质量要求

岗梅种苗质量应符合表 2 的规定。

表 2 岗梅种苗质量要求

项目	质量指标		
	一级	二级	三级
组织形态	主干直立，根系发达、完整，叶片青绿无卷曲，无病虫害。		
地径/ mm	≥5.0	≥4.0	≥3.0
苗高/ cm	≥60	≥40	≥30

5 检验方法

5.1 种子检验

5.1.1 组织形态与色泽、规格

用肉眼或 5 倍~10 倍放大镜对种子形态、颜色等表面特征进行检验，并用游标卡尺测量种子长、宽、厚。

5.1.2 含水量检测

按 GB/T 3543.6 中“5.2 高温烘干法”进行水分测定。

5.1.3 净度检测

按 GB/T 3543.3 进行检测。

5.1.4 千粒重检测

按 GB/T 3543.7 中“12.2 测定方法”项下的“a. 百粒法”进行检测。

5.1.5 发芽率检测

按 GB/T 3543.4 的规定进行检测，或按下列方法：

a) 解除休眠：发芽前低温层积解除休眠。方法与步骤如下：

1) 取净种子适量，室温下用 100 mg/L 赤霉素溶液浸种 24 h；

2) 种子洗净，置于湿润珍珠岩中，10℃~20℃层积 60 天，期间保持湿润；

b) 取样：随机取解除休眠的岗梅种子 4 份，每份 50 粒。

c) 培养：将灭菌后的湿润沙子或泥炭土置于玻璃培养皿（直径 12.5 cm）中，厚度 0.5 cm；取种子均匀排放在沙子或泥炭土上，每个培养皿放 50 粒种子，覆盖一层沙子或泥炭土，厚度 0.2 cm，置于培养箱中，10℃~20℃暗培养。

d) 观察：每日观察，保持发芽床湿润，挑出霉烂种子，记录第 2 天~60 天的种子发芽数与霉烂种子数，以胚根生长长度≥0.5cm 且子叶正常展开，鉴别为正常幼苗，计算发芽率（%）：

$$\text{发芽率} = \frac{\text{种子发芽数}}{200} \times 100\%$$

5.2 种苗检验

5.2.1 外观形态检验

用目测法对根系、茎干、叶片、色泽、病虫害、机械损伤等进行检验。

5.2.2 地径检验

按 GB 6000 的检测方法进行，用游标卡尺测量，如测量的部位出现膨大或干形不圆，则测量其上部苗干起始正常处，读数精确到 0.05 cm。

5.2.3 苗高检验

按 GB 6000 的检测方法进行，用钢卷尺或直尺测量，自地径沿苗干量至顶芽基部，读数精确到 1 cm。

6 检验规则

6.1 扦样

6.1.1 种子扦样

参考 GB/T 3543.2 及 GB 2772 的规定，种子批最大重量和样品最小重量应按表 3 中的规定执行。

表 3 种子批最大重量和样品最小重量要求

种子批的最大重量/kg	样品最小重量/g		
	取样量	净度分析	其它项目分析

1000	300	100	200
------	-----	-----	-----

所要检验的种子来源、产地、数量、贮藏方法、贮藏条件、贮藏时间等要符合表 1 种子质量要求。

6.1.2 种苗扦样

按 GB 6000 中“抽样”项要求执行，采取随机抽样的方法，按表 4 的规定执行。

表 4 种苗检验抽样数量

种苗株数	检测株数
500~1000	50
1001~10000	100
10001~50000	250
50001~100000	350
100001~500000	500
500001以上	750

6.2 检验项目

6.2.1 种子检验项目

种子检验项目为表 1 中规定的所有指标。

6.2.2 种苗检验项目

种苗检验项目为表 2 中规定的所有指标。

6.3 判定规则

6.3.1 种子分级判定规则

- 6.3.1.1 符合 4.1 的种子质量要求，判定为合格。
- 6.3.1.2 采用最低定级原则，以净度、千粒重和发芽率为指标进行等级判定。符合相应等级要求的，判定为该等级；若任一指标低于三级要求，则判定为不合格品。

6.3.2 种苗分级判定规则

- 6.3.2.1 符合 4.2 的种苗质量要求，判定为合格。
- 6.3.2.2 采用最低定级原则，以地径和苗高为指标进行等级判定。符合相应等级要求的，判定为该等级；若任一指标低于三级要求，则判定为不合格品。

7 包装、标志、运输和贮存

7.1 包装

- 7.1.1 包装物应洁净、干燥、无污染。
- 7.1.2 种子可采用洁净的编织袋或布袋进行包装，包装规格为每袋 10kg~50kg。
- 7.1.3 种苗可采用洁净的塑料筐、竹筐、编织袋或塑料袋定量包装，便于长途运输。

7.2 标签

包装物上应当附有标签，注明品名、产地、规格、等级、生产者、生产日期或批号、地址、种子保存有效期、种苗采挖时间、产品标准编号。

7.3 运输

选择透气、防水、洁净的运输工具进行运输，不应与有毒有害物质混装。种苗若确需长途运输，应使用可通风透气的车辆，避免阳光直晒。

7.4 贮存

岗梅种子可放置于（4~10）℃冷库贮藏，保存时间不宜超过 1 年。岗梅种苗应置于阴凉处，贮存应不超过 3 天；若未能及时定植种苗应先假植。